



***Critérios de IC Avançada para acionamento do fluxo (paciente deve apresentar dois critérios ou mais):**

- História de uma internação por IC nos últimos 6 meses
- Baixa funcionalidade, PPS < 50%
- Síndrome de fragilidade do idoso
- Uso de Dobutamina (ou outro inotrópico) por tempo prolongado (maior que 15 dias) ou falha no desmame
- Comorbidades graves associadas:
 1. Neurológica: demência avançada, estado vegetativo persistente ou de mínima consciência
 2. Renal: Insuficiência renal grave (TFG < 15ml/min) em pacientes que não são candidatos ou que recusam tratamento substitutivo e/ou transplante
 3. Hepática: Cirrose Child C, MELD-Na > 30 ou ascite refratária, síndrome hepato-renal ou hemorragia digestiva alta por hipertensão portal persistente apesar de otimização do tratamento ou Carcinoma hepatocelular presente, em estágio C ou D
 4. Oncológica: doença metastática (estádio IV) ou avançada
 5. Respiratória: pneumopatia grave dependente de uso de oxigênio

****PS: Pergunta surpresa com resposta Não: “você se surpreenderia se esse paciente morresse nos próximos 12 meses?”**

***** Enfermeiro assistencial, enfermeiro líder, psicólogo referencia da cardiologia, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, farmacêutico, médico plantonista**

