




Fluxograma 1 – Investigação de Dor Torácica no Pronto Atendimento




Fluxograma 2 – Investigação de Dor torácica no pronto atendimento (avaliação suplementar)

⁵ Pacientes com necessidade já definida de avaliação anatômica ou funcional podem ser colocados na unidade observação antes do resultado da troponina de 3h


⁶ Preocupação com SCA baseada no avaliação clínica; assume que todos os pacientes com alta preocupação não se enquadram no algoritmo e já foram admitidos internação e avaliação complementar.

⁷ Considere teste de estratificação prévio – há quanto tempo, eficácia, resultados. Considerar agregação de imagem anatômica ou funcional caso o teste prévio tenha sido ergometria.

⁸ Se não for possível confirmar reavaliação precoce, considere teste funcional ou anatômico no mesmo dia



Fluxograma 3 – Investigação de Dor Torácica em pacientes internados





Fluxograma 4 – Investigação de Dor torácica em pacientes internados (avaliação suplementar)

⁵ Baseada no avaliação clínica; assume que todos os pacientes com alta preocupação sejam estratificados.

⁶ Considere teste de estratificação prévio – há quanto tempo, eficácia, resultados. Considerar agregação de imagem anatômica ou funcional caso o teste prévio tenha sido ergometria.

