Índice

- [Tireoidectomia total](#)
- [Tireoidectomia com esvaziamento cervical central e lateral](#)
- [Parotidectomia com conservação do nervo facial](#)

Tireoidectomia

Equipes médicas	Cirurgiões de Cabeça e Pescoço
Códigos Cirúrgicos Possíveis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tireoidectomia total (TUSS 30213053) ou 2. Tireoidectomia parcial (TUSS 30213045)
Códigos Associados	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitorização neurofisiológica intra-operatória (TUSS 20202040)
Caráter	Eletivo
Critérios de inclusão	<ul style="list-style-type: none"> • Todos os pacientes adultos (idade $\geq$ 18 anos) que forem submetidos a cirurgia de Tireoidectomia total • Pacientes com neoplasia de tireoide, lesões suspeitas de neoplasias, nódulos com padrão de crescimento rápido com 4 cm de diâmetro, nódulos ou bócios mergulhantes ou estético por abaulamento cervical.
Critérios de exclusão	<ul style="list-style-type: none"> • Tireoidectomia com esvaziamento cervical • Bócio mergulhante com necessidade exclusiva de toracotomia esternotomia • Tireoidectomia com ressecção ampliada (traquéia, laringe ou esôfago) • Tireoidectomia no contexto de outras doenças (câncer de laringe, câncer de faringe, Câncer de esôfago, hiperparatireoidismo, doenças extra-tireoidianas) • Técnicas de ablação de tireóide • Esvaziamentos cervicais laterais • Carcinoma anaplásico de tireóide
Cuidados pré-operatórios	<ul style="list-style-type: none"> • Obtenção do termo de consentimento específico para cirurgia; • Avaliação pré-anestésica e alocação pós-operatória conforme risco clínico – CORP–POL–CORP–007 e CORP–NOR–CORP-015; • Orientação sobre suspensão de medicamentos - Manejo de terapia antitrombóticas e distúrbios da coagulação no perioperatório – HSL-PROT-CORP-019. • Orientação sobre jejum abreviado; <ul style="list-style-type: none"> - Diretriz para jejum pré-operatório - CORP-MAN-ANEST-001
Intraoperatório	<ul style="list-style-type: none"> • Adesão ao protocolo de cirurgia segura <ul style="list-style-type: none"> - CORP-PLAN-CORP-014 – Cirurgia Segura - CORP-POL-CC-001 - Política de Anestesia e Sedação • Antibioticoprofilaxia, conforme manual de <i>Antibioticoprofilaxia Sírio-Libanês</i> <ul style="list-style-type: none"> - Cefazolina 2g até 60 minutos antes do procedimento e suspensão até 24 horas após procedimento • Dosagem de PTH intra-operatório • Profilaxia de TEV conforme protocolo institucional <ul style="list-style-type: none"> - HSL-PROT-CORP-006 – Protocolo Gerenciado de Profilaxia de TEV • Anestesia: Geral • Tempo médio de sala: 180 minutos • Anatomopatológico: até 4 peças • Congelamento em sala: sim

OPME	<p>01 Kit Monitor de nervos laríngeos (monopolar para monitor de nervo, cânula reforçada para estimulação de nervo laríngeo)</p> <p>01 Pinça seladora de vasos sanguíneos padrão do hospital (ultracision)</p> <p>Surgicel hemostático absorvível ou fibrilar</p> <p>Dermabond</p>	
Cuidados pós-operatórios (intra-hospitalar)	<ul style="list-style-type: none"> ● Tempo de permanência previsto <ul style="list-style-type: none"> ○ Até 2 dias (Unidade de internação não crítica) ● Dosagem de cálcio ● Profilaxia de TEV conforme protocolo institucional - HSL-PROT-CORP-006 – Protocolo Gerenciado de Profilaxia de TEV 	
Orientação para alta	SEM (sinais de alerta)	<p>Orientações sobre sinais de alerta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Febre ● Sinais de hipocalcemia (câimbras e formigamentos) ● Abaulamentos cervicais ● Saída de secreção pela ferida operatória ● Edema de membros inferiores ● Falta de ar ● Queda
	Fazer	<ul style="list-style-type: none"> ● Não realizar atividades na água como piscinas, saunas, banheiras, hidroginástica e praia por pelo menos 7 dias ● Evitar grandes esforços ● Não levantar objetos pesados ● Não dirigir antes da liberação médica
	Agendar retornos	Orientações sobre retorno com cirurgião de acordo com a alta
	Levar	<p>Documentos</p> <p>- resumo de alta, receituário, atestados</p>
	Tomar	<p>Analgesia</p> <p>Carbonato de cálcio 500 mg 8/8h (a critério médico).</p> <p>Calcitriol 0,25 mcg 12/12h (a critério médico).</p>

Tireoidectomia e Parotidectomia
Procedimentos e Protocolos

		Reposição hormonal de levotiroxina a critério médico Reconciliação medicamentosa
	Avaliar compreensão	Confirmar compreensão do paciente

Composição dos kits de tireoidectomia total por fabricante homologado

A) PHYSIOMED®

Physiomed				
REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	FABRICANTE	COD. TASY	QUANTIDADE
ENDT75M	Kit Cânula C2 Select 360 Graus para Estimulação Recorrente com 4 Canais	RBTG Brasil	281999	1

B) ALLEN®

Allen				
REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	FABRICANTE	COD. TASY	QUANTIDADE
KCMN	Kit Cânula para Monitorização Neurofisiológica	Starmedix	443554	1

C) SUPRI®

Supri				
REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	FABRICANTE	COD. TASY	QUANTIDADE
8227411	Eletrodos Subdérmicos Pareados 4 Canais 1 Conjunto - Caixa com 3 unidades	Supri Artigos Médicos	427780	1
8225101	Sonda Eletroestimuladora Prass PadrãoSupri Artigos Médicos - SP (Filial)	Supri Artigos Médicos	423621	1

Tireoidectomia com esvaziamento cervical central e lateral

Equipes médicas	Cirurgiões de Cabeça e Pescoço
Códigos Cirúrgicos Possíveis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tireoidectomia total (TUSS 30213053) 2. Esvaziamento cervical seletivo - especificar lado (TUSS 30212057 - 1X ou 2X) 3. Esvaziamento cervical radical - especificar lado (TUSS 30212030 - 1X ou 2X)
Códigos Associados	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitorização neurofisiológica intra-operatória TUSS 20202040
Caráter	Eletivo
Crítérios de inclusão	<ul style="list-style-type: none"> • Todos os pacientes adultos (idade $\geq$ 18 anos) que forem submetidos a cirurgia de Tireoidectomia total • Pacientes com neoplasia de tireóide, lesões suspeitas de neoplasias, com nódulos suspeitos ou positivos para metástases linfonodais no nível VI ou nos níveis cervicais laterais (II-III-IV e V)
Crítérios de exclusão	<ul style="list-style-type: none"> • Bócio mergulhante com necessidade exclusiva de toracotomia/ esternotomia • Tireoidectomia com ressecção ampliada (traquéia, laringe ou esôfago) • Tireoidectomia no contexto de outras doenças (câncer de laringe, câncer de faringe, Câncer de esôfago, hiperparatireoidismo, doenças extra-tireoidianas) • Técnicas de ablação de nódulos de tireóide • Carcinoma anaplásico de tireóide
Cuidados pré-operatórios	<ul style="list-style-type: none"> • Obtenção do termo de consentimento específico para cirurgia; • Avaliação pré-anestésica e alocação pós-operatória conforme risco clínico – CORP–POL–CORP–007 e CORP–NOR–CORP–015; • Orientação sobre suspensão de medicamentos - Manejo de terapia antitrombóticas e distúrbios da coagulação no perioperatório – HSL-PROT-CORP-019. • Orientação sobre jejum abreviado; <ul style="list-style-type: none"> - Diretriz para jejum pré-operatório - CORP-MAN-ANEST-001
Intraoperatório	<ul style="list-style-type: none"> • Adesão ao protocolo de cirurgia segura <ul style="list-style-type: none"> - CORP-PLAN-CORP-014 – Cirurgia Segura - CORP-POL-CC-001 - Política de Anestesia e Sedação • Antibioticoprofilaxia, conforme manual de <i>Antibioticoprofilaxia Sírio-Libanês</i> <ul style="list-style-type: none"> - Cefazolina 2g até 60 minutos antes do procedimento e suspensão até 24 horas após procedimento • Dosagem de PTH intraoperatório • Profilaxia de TEV conforme protocolo institucional <ul style="list-style-type: none"> - HSL-PROT-CORP-006 – Protocolo Gerenciado de Profilaxia de TEV • Anestesia: Geral • Tempo médio de sala: 420 minutos • Anatomopatológico: até 4 peças • Congelamento em sala: sim

<p>OPME</p>	<p>01 Kit Monitor de nervos laríngeos (monopolar para monitor de nervo, cânula reforçada para estimulação de nervo laríngeo)</p> <p>01 Pinça seladora de vasos sanguíneos padrão do hospital (ultracision)</p> <p>02 ou 04 eletrodos para monitorização do ramo marginal do nervo facial e nervo acessório</p> <p>Surgicel hemostático absorvível ou fibrilar</p> <p>Dermabond</p>	
<p>Cuidados pós-operatórios (intra-hospitalar)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Tempo de permanência previsto <ul style="list-style-type: none"> ○ Até 5-7 dias (Unidade de internação não crítica) ● Dosagem de cálcio e PTH ● Profilaxia de TEV conforme protocolo institucional <ul style="list-style-type: none"> - HSL-PROT-CORP-006 – Protocolo Gerenciado de Profilaxia de TEV 	
<p>Orientação para alta</p>	<p>SEM (sinais de alerta)</p>	<p>Orientações sobre sinais de alerta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Febre ● Sinais de hipocalcemia (câimbras e formigamentos) ● Abaulamentos cervicais ● Saída de secreção pela ferida operatória ● Edema de membros inferiores ● Falta de ar ● Queda
	<p>Fazer</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Não realizar atividades na água como piscinas, saunas, banheiras, hidroginástica e praia por pelo menos 7 dias ● Evitar grandes esforços ● Não levantar objetos pesados ● Não dirigir antes da liberação médica
	<p>Agendar retornos</p>	<p>Orientações sobre retorno com cirurgião de acordo com a alta</p>
	<p>Levar</p>	<p>Documentos</p> <p>- resumo de alta, receituário, atestados</p>
	<p>Tomar</p>	<p>Analgesia</p> <p>Carbonato de cálcio 500 mg 8/8h (a critério médico).</p> <p>Calcitriol 0,25 mcg 12/12h (a critério médico).</p>

Tireoidectomia e Parotidectomia
Procedimentos e Protocolos

		Reposição hormonal de levotiroxina a critério médico Reconciliação medicamentosa
	Avaliar compreensão	Confirmar compreensão do paciente

Composição dos kits de tireoidectomia total com esvaziamento central por fabricante homologado

A) PHYSIOMED®

Physiomed				
REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	FABRICANTE	COD. TASY	QUANTIDADE
ENDT75M	Kit Cânula C2 Select 360 Graus para Estimulação Recorrente com 4 Canais	RBTG Brasil	281999	1

B) ALLEN®

Allen				
REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	FABRICANTE	COD. TASY	QUANTIDADE
KCMN	Kit Cânula para Monitorização Neurofisiológica	Starmedix	443554	1

C) SUPRI®

Supri				
REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	FABRICANTE	COD. TASY	QUANTIDADE
8227411	Eletrodos Subdérmicos Pareados 4 Canais 1 Conjunto - Caixa com 3 unidades	Supri Artigos Médicos	427780	1
8225101	Sonda Eletroestimuladora Prass Padrão Supri Artigos Médicos - SP (Filial)	Supri Artigos Médicos	423621	1
8229960	Tube Endotraqueal Nim Flex para Monitorização 6,0 mm x 8,4 mm - 5 Unidades	Supri Artigos Médicos	423859	1

Composição dos kits de tireoidectomia total com esvaziamento central e lateral por fabricante homologado

A) PHYSIOMED®

Physiomed				
REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	FABRICANTE	COD. TASY	QUANTIDADE
CERV70M	Kit Cânula para Esvaziamento Cervical Monopolar	RBTG Brasil	398634	1
ENDT75M	Kit Cânula C2 Select 360 Graus para Estimulação Recorrente com 4 Canais	RBTG Brasil	281999	1

B) ALLEN®

Allen				
REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	FABRICANTE	COD. TASY	QUANTIDADE
KCMN	Kit Cânula para Mapeamento Tireoidectomia Com esvaziamento Cervical	Starmedix	443555	1

C) SUPRI®

Supri				
REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	FABRICANTE	COD. TASY	QUANTIDADE
8227411	Eletrodos Subdérmicos Pareados 4 Canais 1 Conjunto - Caixa com 3 unidades	Supri Artigos Médicos	427780	1
8225101	Sonda Eletroestimuladora Prass PadrãoSupri Artigos Médicos - SP (Filial)	Supri Artigos Médicos	423621	1
8229960	Tube Endotraqueal Nim Flex para Monitorização 6,0 mm x 8,4 mm - 5 Unidades	Supri Artigos Médicos	423859	1

Parotidectomia parcial ou total com conservação do nervo facial

Equipes médicas	Cirurgiões de Cabeça e Pescoço
Códigos Cirúrgicos Possíveis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Parotidectomia parcial com conservação do nervo facial (TUSS 30204046) ou 2. Parotidectomia total com conservação do nervo facial (TUSS 30204062)
Códigos Associados	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitorização neurofisiológica intra-operatória TUSS 20202040
Caráter	Eletivo
Crítérios de inclusão	<ul style="list-style-type: none"> • Todos os pacientes adultos (idade $\geq$ 18 anos) que forem submetidos a cirurgia de parotidectomia parcial ou total com conservação do nervo facial • Pacientes com tumores de parótida.
Crítérios de exclusão	<ul style="list-style-type: none"> • Parotidectomia com esvaziamento cervical • Tumores de parótida com invasão local • Parotidectomia tática e em contexto de outras doenças
Cuidados pré-operatórios	<ul style="list-style-type: none"> • Obtenção do termo de consentimento específico para cirurgia; • Avaliação pré-anestésica e alocação pós-operatória conforme risco clínico – CORP-POL-CORP-007 e CORP-NOR-CORP-015; • Orientação sobre suspensão de medicamentos - Manejo de terapia antitrombóticas e distúrbios da coagulação no perioperatório – HSL-PROT-CORP-019. • Orientação sobre jejum abreviado; <ul style="list-style-type: none"> - Diretriz para jejum pré-operatório - CORP-MAN-ANEST-001
Intraoperatório	<ul style="list-style-type: none"> • Adesão ao protocolo de cirurgia segura <ul style="list-style-type: none"> - CORP-PLAN-CORP-014 – Cirurgia Segura - CORP-POL-CC-001 - Política de Anestesia e Sedação • Antibioticoprofilaxia, conforme manual de <i>Antibioticoprofilaxia Sírio-Libanês</i> <ul style="list-style-type: none"> - Cefazolina 2g até 60 minutos antes do procedimento e suspensão até 24 horas após procedimento • Profilaxia de TEV conforme protocolo institucional <ul style="list-style-type: none"> - HSL-PROT-CORP-006 – Protocolo Gerenciado de Profilaxia de TEV • Anestesia: Geral • Tempo médio de sala: 180 minutos • Anatomopatológico: até 4 peças • Congelamento em sala: sim

<p>OPME</p>	<p>01 Kit de monitorização de nervo facial</p> <p>01 Pinça seladora de vasos sanguíneos padrão do hospital (ultracision)</p> <p>Surgicel hemostático absorvível ou fibrilar</p> <p>Dermabond</p>	
<p>Cuidados pós-operatórios (intra-hospitalar)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Tempo de permanência previsto <ul style="list-style-type: none"> ○ Até 2 dias (Unidade de internação não crítica) ● Profilaxia de TEV conforme protocolo institucional - HSL-PROT-CORP-006 – Protocolo Gerenciado de Profilaxia de TEV 	
<p>Orientação para alta</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● SEM (sinais de alerta) 	<ul style="list-style-type: none"> ● Orientações sobre sinais de alerta: ● Febre ● Abaulamentos face ● Saída de secreção pela ferida operatória ● Edema de membros inferiores ● Falta de ar ● Queda
	<p>Fazer</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Não realizar atividades na água como piscinas, saunas, banheiras, hidroginástica e praia por pelo menos 7 dias ● Evitar grandes esforços ● Não levantar objetos pesados ● Não dirigir antes da liberação médica
	<p>Agendar retornos</p>	<p>Orientações sobre retorno com cirurgião de acordo com a alta</p>
	<p>Levar</p>	<p>Documentos</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Resumo de alta, receituário, atestados
	<p>Tomar</p>	<p>Analgesia Reconciliação medicamentosa</p>
	<p>Avaliar compreensão</p>	<p>Confirmar compreensão do paciente</p>

Composição dos kits de parotidectomia com conservação do nervo facial por fabricante homologado

A) PHYSIOMED®

Physiomed				
REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	FABRICANTE	COD. TASY	QUANTIDADE
CERV70M	Kit Cânula SDN Nervos Faciais Monopolar 4 Pares	RBTG Brasil	298368	1

B) ALLEN®

Allen				
REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	FABRICANTE	COD. TASY	QUANTIDADE
KCF	Kit Cânula Facial	Starmedix	443553	1

C) SUPRI®

Supri				
REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	FABRICANTE	COD. TASY	QUANTIDADE
8227411	Eletrodos Subdérmicos Pareados 4 Canais 1 Conjunto - Caixa com 3 unidades	Supri Artigos Médicos	427780	1
8225101	Sonda Eletroestimuladora Prass PadrãoSupri Artigos Médicos - SP (Filial)	Supri Artigos Médicos	423621	1